



## Sauva Negra

Castellcir

### Ubicació

**Comarca:** Moianès  
**Lloc/Adreça:** Al sudest del nucli de Santa Coloma Sasserra  
**Emplaçament**  
**Alçada:** A cavall dels termes municipals de Castellcir, Balenyà i Centelles.  
830

### Coordenades:

**Latitud:** 41.78483  
**Longitud:** 2.17876  
**UTM Est (X):** 431758  
**UTM Nord (Y):** 4626212

### Classificació

**Número de fitxa** 08055 - 121  
**Àmbit:** Patrimoni natural  
**Tipologia** Zona d'interès  
**Estat de conservació** Bo  
**Protecció** Legal  
**Observacions protecció:** PEIN: Decret 328/1992  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Altres  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** Diversos propietaris  
**Fitxes associades:**  
[El pou del Cavaller](#)  
**Autoria de la fitxa** Xavier Bermúdez (iPAT Serveis Culturals)  
**Data de registre de la fitxa:** dc., 01/07/2020 - 02:00

### Descripció

L'espai protegit de la Sauva Negra comprèn l'extrem nord-est del municipi de Castellcir i encavalca amb els termes de Balenyà i Centelles (Osona). En total, abasta 110,56 ha, de les quals 67,77 són dins el terme de Castellcir.

Els trets més característics d'aquest espai són el paisatge subhúmit de l'altiplà del Moianès, amb comunitats vegetals que se situen en el límit sud de la seva distribució (com la fageda) i algunes espècies de fauna d'influència centreeuropea.

El medi físic està marcat per la seva ubicació en una vessant molt inclinada (que va de 942 a 750 m d'altitud en tan sols 490 d'amplada) vers l'obaga, el que li confereix unes condicions d'humitat constants. El substrat geològic és bàsicament calcari amb gresos i margues de l'eocè marí.

La flora i la vegetació predominant és de caràcter extramediterrani, com ara la fageda i altres elements de caràcter eurosiberià.

Quant a la fauna, es poden observar espècies de caire centreeuropeu. És una zona rica en predadors: entre els mamífers, hi ha el turó (*Mustela putorius*), la fagina (*Martes foina*), la geneta (*Genetta genetta*), la mostela (*Mustela nivalis*), el teixó (*Meles meles*) i la guineu (*Vulpes vulpes*); entre les aus, l'àguila marcenca (*Circaetus gallicus*) i l'aligot vesper (*Pernis apivorus*). La presència de predadors va en consonància a la de presses, entre les quals hi ha espècies eurosiberianes, com el talpó muntanyenc (*Microtus agrestis*) i musaranyes: la musaranya nana (*Sorex minutus*) i la musaranya cuaquadrada (*Sorex araneus*). Més enllà dels rapinyaires enumerats, les aus presents inclouen espècies com el picot negre (*Dryocopus martius*), el picot garser gros (*Dendrocopos major*), el pica-soques blau (*Sitta europaea*), la mallerenga d'aigua (*Parus palustris*) o el mosquiter comú (*Phylloscopus collybita*).

Entre els invertebrats, destaquen coleòpters cerambícids com el *Lucanus cervus* o la *Rosalia alpina* (aquesta última, de gran interès) i el lepidòpter *Graellsia isabellae*.

La conservació d'aquesta massa boscosa es deu, en part, a la seva no aptitud per a l'agricultura, si bé s'hi duen a terme activitats silvícoles i ramaderes.

