



## PEIN Valls del Sió-Llobregós

Castellfollit de Riubregós

### Ubicació

**Comarca:** Anoia  
**Lloc/Adreça:** Franja central del terme  
**Emplaçament** Franja muntanyosa al sud del nucli urbà.  
**Alçada:** 532

### Coordenades:

**Latitud:** 41.77259  
**Longitud:** 1.43389  
**UTM Est (X):** 369836  
**UTM Nord (Y):** 4625713

### Classificació

**Número de fitxa** 08060 - 90  
**Àmbit:** Patrimoni natural  
**Tipologia** Zona d'interès  
**Estat de conservació** Bo  
**Protecció** Legal  
**Tipus de protecció:** Xarxa natura 2000  
**Europea – Atributs** Natura 2000 – Àrea especial de conservació  
**inspire:**  
**Observacions protecció:** PEIN Valls del Sió-Llobregós  
**Data aprovació:** dt., 05/09/2006 - 12:00  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Productiu  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** Diversos propietaris, tant públics com privats

### Fitxes associades:

[Font dels Afores](#)

[Torre del Ballester. Torre del Balet](#)

[Camí de la Terrissa](#)

[Pou dels Moros](#)

[El Colomar. Columbari de la Terrissa](#)

Roques de Can Torres

Barraca del Magrà del Bep

Cova dels Enconills

Pou del Torrent de la Terrissa

Torre del Cap Xic

**Autoria de la fitxa**

Xavier Bermúdez López

**Data de registre de la**

dt., 12/04/2016 - 02:00

**fitxa:**

## Descripció

Zona d'interès natural inclosa en el PEIN Valls del Sió-Llobregós, que agrupa espais de les comarques de la Noguera, l'Urgell, la Segarra i l'Anoia (amb Castellfollit de Riubregós com a únic municipi integrat). Dins el terme de Castellfollit de Riubregós ocupa una franja de 463,11Has (un 17,66% del terme) situada entre el curs del Llobregós i la Serra de Cascats. Aquesta zona està formada geològicament per materials guixencs que afloren en el nucli erosionat de l'anticlinal de Sanaüja i Ponts. Marcats per aquest substrat, l'ús del sòl compagina terrenys de cultiu dispersos amb zones boscoses i de matollar on també hi ha espais de vegetació gipsícola, com les timonedes gipsícoles continentals de gatunyes (*Ononis tridentata*) i trincoles (*Gypsophyla hispanica*), així com el romaní blanc (*Helianthemum esquamatum*). A les solanes, on desapareixen els guixos, hi ha freqüents matollars calcícoles de romaní o petits fragments de carrascars i, a les obagues, es formen rouredes de roure de fulla petita (*Quercus faginea*). Pel que fa a la fauna, és una bona zona de dispersió de joves d'àguila cuabarrada (*Hieraaetus fasciatus*). També hi ha ocells esteparis com el sisó (*Tetrax tetrax*), així com el gaig blau (*Coracias garrulus*).

## Bibliografia

[http://mediambient.gencat.cat/ca/05\\_ambits\\_dactuacio/patrimoni\\_natural/senp\\_catalunya/espais\\_sistema/lleida/lvr](http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/espais_sistema/lleida/lvr)

