



Bosc de la font de la Pascola (Les Conilleres)

Castellví de la Marca

Ubicació

Comarca:	Alt Penedès
Lloc/Adreça:	Al fondo de sobre de la font de la Pascola
Emplaçament	A part del bosc motiu d'aquesta fitxa, trobem retalls d'aquesta comunitat en marges entre conreus, v

Coordenades:

Latitud:	41.35426
Longitud:	1.60955
UTM Est (X):	383688
UTM Nord (Y):	4579017

Classificació

Número de fitxa	08065 - 118
Àmbit:	Patrimoni natural
Tipologia	Zona d'interès
Estat de conservació	Regular
Notes de conservació:	Menys la taca esmentada de les Conilleres que es troba en bon estat, només queden al municipi petits fragments enmig de conreus o a les vores dels torrents i rieres. Aquests fragments estan força degradats com a conseqüència de les tales i les cremades efectuades pels pagesos.
Protecció	Legal
Observacions protecció:	Hàbitat inclòs en la Directiva comunitària.
Accés	Fàcil
Ús actual:	Social
Titularitat	Privada
Fitxes associades:	
<u>Alzines de can Morgades</u>	
Autoria de la fitxa	Triade scp

Data de registre de la fitxa: dg., 08/08/1999 - 02:00

Descripció

Es tracta d'un àrea d'unes 5 ha ocupada per la comunitat d'alzinar amb carrasca (Viburno-Quercetum ilicis sabasc. Junipero quercetosum rotundifoliae). És destacable perquè és una extensió important, si tenim en compte les poques taques d'alzinar ben conservat que resten a tot el Penedès. L'alzinar amb carrasca és la comunitat forestal que potencialment ocuparia la major part del municipi de Castellví. Fa de transició entre els carrascars i els alzinars amb marfulls típics. A Castellví es dona aquesta zona de transició i per això trobem aquesta comunitat. Cal esmentar, però que l'alzina (*Quercus ilex ilex*) i la carrasca (*Quercus ilex rotundifolia*) s'hibriden molt fàcilment donant descendents fèrtils (*Quercus x ambigua*). Són comunitats amb aspecte general més pobre i eixut, no tan exuberants com les variants precedents. Les plantes característiques de l'alzinar litoral típic hi són rares i en alguns casos, com el marfull, inexistents; abunden sobretot les espècies característiques de l'ordre i la classe com el llentiscle, el garric, l'aladern, destacant el margalló (en la seva variant més termòfila i present només en l'àrea de distribució d'aquesta palmera) i l'arçot, espècies de la màquia de garric i margalló.

Observacions:

Referència cartogràfica: mapa topogràfic de Catalunya 1:5000, Ratera 419-4-8 (276-128). Institut Cartogràfic de Catalunya. 1a. Edició: setembre 1995.

